Übungen

Verbrauchserfassung

Übungsaufgabe 1

Bitte berechnen Sie aus der unten dargestellten Verlaufsmedikation die i.v. bzw. oral verabreichten Tagesdosen von Cefuroxim in DDD und RDD

Verlaufsmedikation über 6 Tage

Tag	Wirkstoff	Tagesdosis	Applikation		Bemerkung
			i.v.	p.o.	
1	Cefuroxim	1,5 g	x		Start
2	Cefuroxim	4,5 g	x		
3	Cefuroxim	4,5 g	x		
4	Cefuroxim	4,5 g	x		
5	Cefuroxim	3 g	x		Switch
5	Cefuroxim	0,5 g		x	
6	Cefuroxim	1 g		x	Stop

DDD Cefuroxim i.v.: 3 g
DDD Cefuroxim p.o.: 0,5 g

RDD Cefuroxim i.v.: 4,5 g
RDD Cefuroxim p.o.: 1 g

Tabelle zum Eintragen der Ergebnisse

	iv	po	gesamt
Gramm			
DDD			
RDD			

Übungsaufgabe 2

KH A verbraucht 6.000 Infusionslösungen Cefuroxim 1,5g im Jahr.
Anzahl der Pflegetage im Auswertungszeitraum sind 60.000.

- Wie viele DDD bzw RDD wurden verbraucht?

- Wie hoch ist die Verbrauchsdichte in DDD bzw. RDD pro 100 Pflegetage?

DDD Cefuroxim i.v.: 3 g
RDD Cefuroxim i.v.: 4,5 g

Übungsaufgabe 3

Wie hoch ist die Verbrauchsdichte der Stationen von Ciprofloxacin und Moxifloxacin bzw. von Chinolonen gesamt?

Station 1	**5.000 Patiententage**	Verbrauchsdichte RDD /100 Pat-Tage	Verbrauchsdichte Chinolone Stat. 1
Station 2	**8.000 Patiententage**	Verbrauchsdichte RDD /100 Pat-Tage	Verbrauchsdichte Chinolone Stat. 2

RDD Ciprofloxacin i.v.: 800 mg
RDD Moxifloxacin i.v.: 400 mg

Übungsaufgabe 4

KH B verbraucht 6000 Infusionslösungen Flucloxacillin 2g
Anzahl der Pflegetage im Auswertungszeitraum sind 50.000.

- Wie viele DDD bzw RDD wurden verbraucht?
- Wie hoch ist die Verbrauchsdichte in DDD bzw. RDD pro 100 Pflegetage?

DDD Flucloxacillin i.v.: 2 g
RDD Flucloxacillin i.v.: 8 g