

C. difficile Infektion

Aufgabe 3

Die Therapie-Empfehlung bezüglich der ersten Episode einer C. difficile-Infektion wird in den meisten Leitlinien nach Schweregrad der Erkrankung stratifiziert. Diskrepante Empfehlungen gibt es insbesondere für die leichte bis moderate C. difficile-Infektion. Während die deutsche S2K Leitlinie für solche Fälle Metronidazol empfiehlt, sieht die aktuelle Leitlinie der IDSA auch bei nicht-schwerer Krankheitsausprägung Metronidazol nur noch als Reservetherapeutikum, wenn Vancomycin oder Fidaxomicin nicht verfügbar sind.

Entwerfen Sie eine für ein deutsches Krankenhaus geeignete Empfehlung zur Therapie der ersten und ggfs. zweiten Episode einer C. difficile-Infektion und begründen Sie Ihre Empfehlungen unter besonderer Berücksichtigung der oben geschilderten Diskrepanz.

Material

Hagel et al.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25965989/>

McDonald et al.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29462280/>

Igarashi et al.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30170735/>

Dubberke et al.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32523972/>

Lübbert et al.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29807377/>